


LUPKYNIS es el primer medicamento oral aprobado por la FDA específicamente para la nefritis lúpica. Si cree que LUPKYNIS podría ser adecuado para usted, consulte a su médico al respecto. Luego, use esta guía como marco para obtener las respuestas que necesita, de modo que pueda sentirse seguro al analizar LUPKYNIS con su médico.

Preparación para su cita

Su médico es su socio. Cuanto más le haga saber sobre sus síntomas y preguntas, más lo podrá ayudar.

- **Tome notas** con anticipación y durante su conversación.
- **Haga a su médico** todas sus preguntas y comparta cualquier actualización de sus otros médicos.
- **Comparta todos sus síntomas**, incluso si no parecen estar relacionados con su nefritis lúpica, para ayudar a mantener informado a su médico.
- **Traiga una lista de todos sus medicamentos**, vitaminas y suplementos
- **Traiga a alguien para que le brinde apoyo si puede**, porque siempre es bueno tener un segundo par de ojos y oídos.



La Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA):

- Aprueba los fármacos que se prueban minuciosamente.
- Mantiene altos estándares de seguridad y eficacia para los fármacos.

¿Qué es LUPKYNIS?

LUPKYNIS es un medicamento recetado que se usa con otros medicamentos para tratar adultos con nefritis lúpica activa. LUPKYNIS no debe tomarse con un medicamento llamado ciclofosfamida. Hable con su proveedor de atención médica si no está seguro de si toma este medicamento.


Información importante de seguridad

LUPKYNIS puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

- **Aumento del riesgo de cáncer.** Las personas que toman LUPKYNIS tienen un mayor riesgo de contraer algún tipo de cáncer, incluido cáncer de piel y de los ganglios linfáticos (linfoma). Limite y evite la exposición a la luz solar y la luz ultravioleta (UV) como máquinas de bronceado. Use ropa de protección y protector solar.

La información importante de seguridad continúa.


Para visitas virtuales:



- Pruebe su conexión a Internet con anticipación.
- Descargue cualquier software necesario.
- Encuentre un espacio tranquilo y privado.
- Tenga papel y un bolígrafo a mano para tomar notas (para no alternar entre pantallas).
- Haga preguntas al principio de la conversación para no estar apurado al final.

P: ¿Podría LUPKYNIS ayudar a controlar mi nefritis lúpica?

- ¿Cómo funciona LUPKYNIS?
- ¿Cómo se toma LUPKYNIS?
- ¿Qué efectos secundarios debo tener en cuenta?



P: ¿Cómo comenzar a recibir LUPKYNIS cambiaría mi plan de tratamiento?

- ¿Podría esto ayudar a reducir mi dosis de corticoesteroides?
- ¿Debo seguir tomando mis otros medicamentos?
- ¿Qué sucede con mis vitaminas y suplementos?
- ¿Hay otras cosas que deba cambiar (dieta, hábitos de ejercicio, etc.)?

Información importante de seguridad (continuación)

- **Aumento del riesgo de infección.** LUPKYNIS es un medicamento que afecta el sistema inmunitario. LUPKYNIS puede disminuir la capacidad del sistema inmunitario para combatir infecciones. Pueden ocurrir infecciones graves en personas que toman LUPKYNIS, lo que puede provocar hospitalizaciones y causar la muerte. **Llame a su proveedor de atención médica de inmediato** si tiene síntomas de una infección como fiebre, sudoración o escalofríos, tos o síntomas similares a los de la gripe, dolores musculares o zonas calientes, rojizas o dolorosas en la piel.


La información importante de seguridad continúa.

P: Si tomo LUPKYNIS, ¿cuáles serán mis objetivos de tratamiento?

- ¿Cómo sabré que LUPKYNIS está actuando?
- ¿Cómo mediremos mi progreso?
- ¿Cuándo será mi próxima cita y qué buscaremos?

No olvide reservar su próxima cita hoy mismo.

P: ¿Con quién debo comunicarme para obtener apoyo?



- ¿Qué tipo de apoyo hay para las personas que toman LUPKYNIS?
- ¿Qué pasa si necesito ayuda para navegar por las opciones de seguro y financiación, o para mantener el rumbo con el tratamiento?

Para obtener apoyo personalizado mientras toma LUPKYNIS, inscribese en Aurinia Alliance y comuníquese con un administrador de casos de enfermería especializado.

Soporte disponible en inglés y español



Información importante de seguridad (continuación)

No tome LUPKYNIS con medicamentos conocidos como inhibidores potentes del CYP3A4, como ketoconazol, itraconazol y claritromicina, o si es alérgico a cualquiera de los ingredientes de LUPKYNIS. No debe comer toronja ni beber jugo de toronja mientras toma LUPKYNIS.

La información importante de seguridad continúa.

Información importante de seguridad (continuación)

Antes de usar LUPKYNIS, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluso si usted:

- Planea recibir alguna vacuna. No debe recibir ninguna vacuna elaborada con microbios vivos durante el tratamiento con LUPKYNIS. Es posible que otras vacunas no funcionen tan bien durante el tratamiento con LUPKYNIS.
- Tiene o ha tenido problemas hepáticos, renales o cardíacos.
- Tiene presión arterial alta.
- Está embarazada o planea quedar embarazada, o si está amamantando o planea amamantar cuando tome LUPKYNIS. Cuando tome LUPKYNIS en combinación con micofenolato de mofetilo, lea la Guía del medicamento para el micofenolato de mofetilo para obtener información importante sobre el embarazo. Estos medicamentos pueden dañar a un bebé en gestación o lactante.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos medicamentos con receta y de venta libre, vitaminas, y suplementos a base de hierbas. LUPKYNIS puede afectar la forma en que actúan otros medicamentos y otros medicamentos pueden afectar la forma en que actúa LUPKYNIS.

LUPKYNIS puede ocasionar efectos secundarios graves, que incluyen:

Problemas renales. Los problemas renales son efectos secundarios

frecuentes de LUPKYNIS y pueden ser graves. Es posible que su proveedor de atención médica le haga ciertas pruebas para controlar la función renal mientras toma LUPKYNIS.

Presión arterial alta. La presión arterial alta es un efecto secundario frecuente de LUPKYNIS y puede ser grave. Su proveedor de atención médica le controlará la presión arterial mientras toma LUPKYNIS y es posible que le pida que se controle la presión arterial en su hogar.

Problemas del sistema nervioso.

Los problemas del sistema nervioso son un efecto secundario frecuente de LUPKYNIS y pueden ser graves. Llame a su proveedor de atención médica o diríjase a la sala de emergencias del hospital más cercano de inmediato si tiene alguno de estos síntomas mientras toma LUPKYNIS:

- Confusión.
- Cambios en el estado de alerta.
- Temblores musculares.
- Entumecimiento y hormigueo.
- Dolor de cabeza.
- Convulsiones.
- Cambios en la visión.

Niveles altos de potasio en la sangre.

Es posible que su proveedor de atención médica le realice ciertas pruebas para controlar sus niveles de potasio mientras toma LUPKYNIS.

Problema grave del ritmo cardíaco (prolongación del intervalo QT).

Recuento bajo de glóbulos rojos (anemia) grave.

Su proveedor de atención médica puede controlar sus análisis de laboratorio mientras usa LUPKYNIS.

Los efectos secundarios más frecuentes de LUPKYNIS son diarrea,

dolor de cabeza, tos, infección de las vías urinarias, dolor de estómago, acidez estomacal y caída de cabello (alopecia).

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de LUPKYNIS. Para obtener más información, consulte a su proveedor de atención médica. Puede informar sobre efectos secundarios a la FDA llamando al **1-800-FDA-1088**. También puede informar efectos secundarios en www.fda.gov/medwatch.

Consulte la Información de prescripción, incluido el recuadro de advertencia, y la Guía del medicamento para LUPKYNIS en este sitio web.